

Immunotherapie Tebentafusp / Kimmtrak®

Beste patiënt

U krijgt een immunotherapie. Hier geven we u graag wat meer informatie. Wij wensen we u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

De therapie

Tebentafusp is een immunotherapie die gebruikt wordt bij HLA-A*02.01-positieve patiënten met een niet opereerbaar of uitgezaaid oogmelanoom. Ongeveer de helft van de mensen is HLA-A*02.01-positief. Dit is een kenmerk van het immuunsysteem dat impact heeft op de tumor en dat bepaald wordt via een bloedtest.

Toediening

Tebentafusp wordt wekelijks via een infuus toegediend.

De therapie kan vooral bij de eerste toedieningen intense bijwerkingen geven. De eerste drie keer wordt de therapie toegediend via een opname met 1 overnachting in het ziekenhuis om de bijwerkingen te monitoren en op te vangen. Meestal hoeft u maar één nacht te blijven.

Als de bijwerkingen onder controle zijn, kunt u terug naar huis. We drijven de dosis keer per keer op tot we de gewenste dosis bereiken. We houden daarbij rekening met de bijwerkingen die u ervaart. U krijgt eventueel bijkomende medicatie om de bijwerkingen onder controle te krijgen.

Zodra uw lichaam aan de medicatie gewend is, verdwijnen de bijwerkingen of zijn ze goed te verdragen. We zetten de behandeling dan verder in het dagziekenhuis. Voor elke dagopname doen we een bloedafname.



Mogelijke bijwerkingen

Cytokinereleasesyndroom

Deze reactie van het lichaam op de immunotherapie treedt vooral de eerste 8 uur na de toediening op. De bijwerking kan ernstig zijn, daarom wordt u in het ziekenhuis opgenomen ter observatie.

Het cytokinereleasesyndroom uit zich door koorts, vermoeidheid, algemeen onwel gevoel, misselijkheid, braken, koude rillingen, lage bloeddruk, duizeligheid, hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag.

Deze reactie verwachten we vooral bij de eerste drie toedieningen en wordt beetje bij beetje milder. Indien nodig geeft de arts u tijdens de opname extra medicatie om de klachten te onderdrukken.

Huidreacties

U kunt last hebben van jeuk, zwelling, droge huid, roodheid en vervelling. Hydrateer uw huid goed met een vochtinbrengende crème tijdens de behandeling.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.