

Carboplatinum - Paclitaxel (taxol)

3-wekelijks

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Paclitaxel ?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend ?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC, PICC toegediend.
- Deze kuur van 2 producten(Carboplatinum en Paclitaxel) wordt toegediend in het oncologisch dagziekenhuis
- Carboplatinum loopt over 1 uur en Paclitaxel over 3 uur
- Voorafgaand aan de Carboplatinum,Paclitaxel en ook nadien wordt er extra vocht toegediend
 - U zal ook 2 medicamenten tegen de misselijkheid mogen innemen (Akynzeo en Dexamethasone 12mg)
- Beide chemo's worden via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u niet te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken.
- Volledige haaruitval (begint na 3-tal weken)
- Koorts temperatuur boven de 38.5 (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering.
- Pijnlijke mond (afters of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping / diarree
- Tintelingen in handen / voeten (zenuwpijnen)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen Paclitaxel (kortademigheid, druk op de borstkas, lage bloeddruk, huidreactie)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, zelfs een glaasje alcohol mag, maar met mate
- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+), en ook een hoofddekseel op te zetten.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer, is het belangrijk tot 7 dagen na de chemotherapietoediening een voorbehoedsmiddel te gebruiken en het is zelfs raadzaam om dit ook achteraf verder te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis geven we u de volgende afspraak mee en een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een dosisaanpassing noodzakelijk is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema.
- De avond vóór de chemotoediening moet u een comprimé Dexamethasone van 20 mg innemen. U krijgt deze mee en is van belang dat u deze zeker inneemt om reactie op de chemo te voorkomen!
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er ook steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via huisarts
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.

- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u 2 maal door.
- Goede opvolging van het stoelgangpatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent zal u verder begeleiden in het verloop van uw behandeling.
- De sociaal assistente zal bij opstart van uw therapie langskomen, om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste zal ook bij u langskomen bij opstart en tijdens uw behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden contacteert u steeds uw huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in het infomapje
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in het infomapje)