

Carboplatinum - Pemetrexed (Alimta)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Pemetrexed?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend in het oncologisch dagziekenhuis
- De kuur loopt over 1 dag
- 1 week voor start therapie wordt gestart met Folavit 0,4 mg 1 maal daags en ook met Neurobion I.M. ; deze laatste dient om de 9 weken te worden toegediend.
- Carboplatinum loopt over 1 uur.
- Pemetrexed loopt over 10 minuten.
- Voorafgaand de Carboplatinum, en ook nadien wordt er extra vocht toegediend.
- Beide chemo's worden via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter.
- Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie inneemt (1 co Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal alsook vanmorgen vóór start therapie!!)

- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u een medicament om misselijkheid te voorkomen Akynzeo 300mg
- Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt)
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Beperkte mate haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Diarree / obstipatie
- Tranende engeïrriteerde ogen
- Smaakverandering

Nabehandeling thuis en praktische info

- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor een paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis wordt aangepast.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie. (1 co Medrol 32 mg voor vanavond , alsook 2 comprimés nog voor morgenvroeg en morgenavond en 3 comprimés als voorbereiding voor de volgende kuur.)
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema.
- Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis.

- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie langs om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden, neemt u steeds contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)