

Chemotherapie Carboplatinum - Caelyx

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

De hiernavolgende chemotherapiebehandeling met Carboplatinum en Caelyx, krijgt u op één bepaalde dag van de week toegediend via het dagziekenhuis, en dit telkens om de 4 weken. Het aantal behandelingen hangt af van hoe u op deze medicatie reageert. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Caelyx en Carboplatinum

Carboplatinum is een kleurloos product dat over ongeveer 60 minuten in de ader inloopt.

Caelyx is oranje-rood van kleur en de inlooptijd duurt ook ongeveer 60 minuten.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
Kan voorkomen gedurende ongeveer de eerste 3 dagen na uw behandeling.
- Lichte haaruitval
Dit kan optreden. Volledige haaruitval is eerder zeldzaam.
- Mondslimvliesontsteking
Dit kan een aantal dagen na uw behandeling voorkomen.
Een goede mondhygiëne is zeker aan te raden. Poets daarom uw tanden met een zachte tandenborstel.



Gebruik zo nodig een ontsmettend mondspoelmiddel zoals Perio-Aid. Bij ernstige mondslijmvliessontsteking neemt u contact op met uw arts via het dagziekenhuis. De arts zal u een speciaal mondspoelmiddel voorschrijven.

- Daling witte bloedcellen
Rond de 10de tot 14de dag na uw behandeling kunnen de witte bloedcellen hun laagste waarde bereiken. Dit betekent dat uw weerstand op dat moment verminderd is en dat u moet opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts. Bij koorts meer dan 38 graden Celsius of tekens van infectie (hoesten, branderig gevoel bij plassen...), neemt u onmiddellijk contact op met uw arts of huisarts. Een tweetal weken na de behandeling laat u bloed prikken bij de huisarts om de weerslag van de therapie op het bloed te controleren.
- Hand-voetsyndroom
Het hand-voetsyndroom bestaat uit pijnlijke, gezwollen, droge, rood verkleurde handen en voeten (vaak met een strakke huid) waarop blaren kunnen zitten. Wij raden ureumzalf of -crème aan. Daarnaast kan het helpen uw handen en voeten goed vet te houden, geen knellende schoenen te dragen en warm water te vermijden.
- Vermoeidheid

Nabehandeling thuis

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.