

Chemotherapie Carboplatinum - Taxol wekelijks

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende therapie voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

De gecombineerde chemotherapiebehandeling met Carboplatinum en Taxol zal u op één bepaalde dag iedere week worden toegediend.

In principe zal deze behandeling gedurende 18 weken worden toegediend

Carboplatinum

Carboplatinum is één van de chemotherapieproducten die u zal toegediend krijgen. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml opgelost wordt. De toediening duurt ongeveer 30 minuten.

Nevenwerkingen

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid, braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- **Een laag aantal witte bloedcellen.**

U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook als u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking,.. moet u altijd zo snel mogelijk uw arts raadplegen.



- **Soms stoornis optreden van uw nierfunctie.**

U kunt hier zelf niets voor doen, maar uw arts zal voor elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Sommige andere medicatie kan ook nierproblemen veroorzaken, als de medicatie samen ingenomen wordt met deze chemotherapie. Bespreek daarom iedere medicatieverandering met uw arts

Taxol

Taxol is het andere chemotherapieproduct dat u zal worden toegediend. Het product is kleurloos. De toediening duurt 1 uur.

Taxol kan soms allergische reacties veroorzaken. Hiervoor zal u thuis de avond voor de chemotherapie 1 capsule Dexamethasone moeten innemen, dit de eerste 2 keer voor uw therapie.

Als u deze tablet vergeten zou zijn, dan kan de behandeling niet doorgaan.

Bijwerkingen

- **Volledige haaruitval**

dit kan voorkomen worden door het gebruik van hoofdhuidkoeling.

- **Laag aantal witte bloedcellen** (zie ook boven vermeld).

- **Soms prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en de voetzolen**

Bij 2 op 3 van de patiënten komen soms prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen voor. Indien dit zo is, meld dit dan steeds aan uw arts. Deze klachten verbeteren geleidelijk aan na het stoppen van de behandeling.

- **Verspreide spier-en gewrichtspijn**

Taxol kan bij een aantal patiënten verspreide spier-en gewrichtspijn veroorzaken en dit meestal een drietal dagen na de toediening. U mag hiervoor steeds een pijnstiller zoals Dafalgan (paracetamol) innemen. Als dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de volgende behandeling.

- **Vermoeidheid**

De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid voelt.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.