

Cisplatinum - Etoposide (Vepesid)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Etoposide?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend op de verblijfsafdeling.
- De kuur loopt over 3 dagen
- Cisplatinum loopt over 4 uur, wordt afgeschermd van het licht en wordt toegediend op de 1ste dag.
- Etoposide loopt over 1 uur en wordt toegediend op dag 1, 2 en 3.
- Voorafgaand aan de toediening van Cisplatinum en ook nadien wordt er extra vocht toegediend.
- Voor de eigenlijke opstart van chemo krijgt u medicatie tegen misselijkheid namelijk Akynzeo en ook Dexamethasone van 12 mg.
- De 2 volgende dagen moet u Dexamethasone 8 mg moeten innemen.
- Beide chemo's worden via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert en of u te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Haarverlies (begint na 3-tal weken)
- Koorts temperatuur van meer dan 38.5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aftan of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping / diarree
- Tintelingen in handen /voeten
- Verminderde nierfunctie (belang van goed te drinken)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, zelfs een glaasje alcohol mag maar met mate.
- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+), en een hoofddekseel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer, is het belangrijk tot 7 dagen na chemotherapietoediening een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis wordt aangepast. Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema (Litan).
- Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis.
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdekseel dicht en spoelt u twee keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige

- geneesmiddelen opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
 - De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz... .
 - **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
 - Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.
 - Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in uw infomapje.
 - Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)