

Cisplatinum-Pemetrexed (Alimta)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Pemetrexed?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend op de verblijfsafdeling.
- De kuur loopt over 1dag
- 1week voor de start chemo dient er Folavit 0,4 mg opgestart te worden net als Neurobion I.M. , deze laatste dient na weken opnieuw te worden toegediend
- Cisplatinum loopt over 4 uur, en wordt afgeschermd van het licht, en wordt toegediend op de 1ste dag.
- Pemetrexed loopt over 10 minuten en wordt toegediend op dag 1.
- Voorafgaand de Cisplatinum, en ook nadien wordt er extra vocht toegediend.
- Beide chemo's worden via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter.
- Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1 co Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal



alsook vanmorgen vóór start therapie !!

- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om misselijkheid te voorkomen Akynzeo 300mg
- Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt)
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook terugvloeï van bloed controleren van uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Beperkte mate haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Diarree / obstipatie
- Tranende en geïrriteerde ogen
- Smaakverandering

Nabehandeling thuis en praktische info

- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis wordt aangepast.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en een overzicht van de nog te nemen medicatie: 1 co Medrol 32 mg voor vanavond , alsook 2 comprimés nog voor morgenvroeg en morgenavond en 3 comprimés als voorbereiding voor de volgende kuur.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema.
- Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het

ziekenhuis.

- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt, doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u bij het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz... .
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje).