

Chemotherapie Ifosfamide

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende therapie voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

De hiernavolgende chemotherapie behandeling met Ifosfamide krijgt u gedurende drie dagen na elkaar toegediend. Daarvoor wordt u 4 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Dit schema wordt in principe om de 3 weken herhaald.

Bijwerkingen

- Ifosfamide kan klachten geven die lijken op een **blaasontsteking**. Het is aan te raden voldoende te drinken (1,5 tot 2 liter per dag) tijdens en na de chemotherapietoediening, zodat alle schadelijke stoffen kunnen worden uitgeplast. Om die reden krijgt u ook veel vocht toegediend via het infuus. De verpleegkundige let tijdens deze behandeling nauwlettend op uw gewicht. Als u te weinig plast en te veel in gewicht toeneemt, kan het zijn dat u extra medicatie krijgt om u meer te doen plassen.
- **Een daling van uw aantal witte bloedcellen** is eveneens een nevenwerking die vrij regelmatig voorkomt. U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts, en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen, ook 's nachts of tijdens het weekend. Ook bij tekens van infectie (hoesten, branderig gevoel bij het plassen...) moet u onmiddellijk uw arts verwittigen. Op ongeveer de 10de dag na de chemotherapie laat u een bloedcontrole doen bij uw huisarts om de weerslag van de chemotherapie op de



bloedcellen na te gaan.

- **Haaruitval** kan ook voorkomen en dit ongeveer 2 tot 4 weken na de start van uw eerste behandeling. Uw haar groeit volledig terug na het stoppen van de behandeling.
- De behandeling met Ifosfamide kan een **negatieve invloed hebben op het zenuwstelsel**. Daardoor kunnen soms milde tot ernstige klachten optreden, zoals:
 - verwardheid
 - moeite met spreken, moeite met stappen, moeite met coördinatie en fijne bewegingen (bijvoorbeeld knopen sluiten)
 - slaperigheid of sufheid
 - waanbeelden (hallucinaties) of vreemde dromen. Het is belangrijk dat u en uw omgeving alert zijn op die klachten. De klachten treden vooral op tijdens de toediening en in de eerste uren na de toediening van de chemotherapie.Soms duren de klachten tot enkele dagen na de toediening. Het is belangrijk dat u, zodra een klacht wordt vastgesteld, een verpleegkundige of arts waarschuwt. De klachten zijn van voorbijgaande aard en laten geen letsels na.

- Misselijkheid en braken
- Smaak- en reuk veranderingen
- Mondslimvlies ontsteking (bv. aften)
- Ongewone vermoeidheid
- Veranderingen in uw stoelgang: diarree of constipatie

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met uw verpleegkundige of arts.