

Chemotherapie Paclitaxel-Taxol (wekelijks)

Beste patiënt

Uw arts heeft volgende behandeling voorgesteld. We geven u in deze brochure graag wat meer uitleg hierover.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxol?

- Het bevat het celremmend geneesmiddel Paclitaxel.
- Voor patiënten met een uitgezaaide longkanker.

Hoe werkt Taxol ?

- Taxanen zoals paclitaxel verstoren de celstructuur waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt. Dit doet het medicijn door de aanmaak van ‘microtubuli’ te verstoren.
- In elke cel bevinden zich deze microtubuli, dit zijn kleine buisvormige structuren in de cel.
- Deze buisjes maken deel uit van het ‘geraamte’ van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.
- Paclitaxel verstoort de aanmaak van deze microtubuli door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande microtubuli worden afgebroken.
- Hierdoor verstikt de cel als het ware in de aangemaakte microtubuli en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Taxol toegediend?

- De therapie wordt in het oncologisch dagziekenhuis toegediend.
- U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.



- U krijgt gedurende 2 opeenvolgende weken therapie en dan 1 weekje rust, om daarna opnieuw hetzelfde te herhalen.
- Meestal zijn het 4 tot 6 cycli (= afhankelijk van resultaat maar ook hoe goed u de behandeling verdraagt).
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter.
- Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1 pil Dexamethasone 8 mg daags voordien bij het avondeten!!!
- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u geen geneesmiddel om misselijkheid te voorkomen: Litan 2 pillen.
- Voor en na de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (= zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt).
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook terugvloei van bloed van uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen om veiligheidsoverwegingen.
- Bij deze kuur hebt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de ijskapkoeling om haarverlies te beperken.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Volledige haaruitval (= start ongeveer 3 weken na toediening). Dit is beperkt of leidt zelfs niet tot haaruitval bij ijskapkoeling.
- Ontsteking van mondslijmvlies (= blaasjes in mond, aften
- Invloed op de bloedcellen (= rode, witte en bloedplaatjes)
- Diarree /obstipatie
- Tintelingen ter hoogte van handen en voeten
- Overgevoelighedsreacties tijdens inlopen product; beklemmend gevoel op de borst, grieperigheid, jeuk , ademnood

Nabehandeling thuis en praktische info.

- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor een paar dagen wordt uitgesteld, of dat er een aanpassing van de dosis noodzakelijk is.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een volgende raadpleging en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie. 1 pil Dexamethasone 8 mg krijgt u mee als voorbereiding voor volgende kuur.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u ook mee samen met het innameschema (Litican).
- Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende keer geven we u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
- Gewoonlijk wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland (na 8 weken).
- Vóór elke toediening is er steeds een bloedafname gepland in het ziekenhuis of via uw huisarts
- Mannelijke patiënten raden we steeds aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt moet u het toiletdeksel sluiten en twee keer spoelen.
- Een goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het hele verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt bi u langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz... .
- Ook de diëtiste krijgt u bij elke opname te zien om te polsen of op vlak van voeding alles vlot verloopt of er eventueel bijsturing of opvolging nodig is.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
 Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u altijd contact op met uw huisarts!!
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in de informatiegids.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in de informatiegids)

