

Vinorelbine mono (Navelbine)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Vinorelbine?

- Product dat op zijn manier de celdeling remt.
- Heeft als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC, PICC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend in het oncologisch dagziekenhuis
- Vinorelbine loopt over 30 minuten
- Voorafgaand aan de toediening van de Vinorelbine en ook nadien wordt er extra vocht toegediend
 - Vóór de eigenlijke toediening krijgt u medicatie tegen de misselijkheid (Litican)
- Chemo wordt via een pomp toegediend.
- De kuur loopt over 3 weken (week 1 en 2 chemo en op week 3 rust)
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u niet teveel last heeft van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 cycli

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Lichte vorm van haarverdunding (begint na 3-tal weken)
- Koorts temperatuur van meer dan 38.5 graden (teken van infectie)



- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (afters of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping / diarree
- Tintelingen in handen / voeten (zenuwpijnen)
- Verminderde nierfunctie (belang van goed te drinken 1,5 liter per dag)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, zelfs glaasje alcohol mag maar met mate.
- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en ook een hoofddeksel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer, is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema.(Litican)
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis.
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw

huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.

- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen vindt u in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)