

# Vitrakvi 25/100 mg (= Larotrectinib)

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

## Wat is Vitrakvi?

- Geneesmiddel voor patiënten met een niet-kleincellige longkanker, met NTRK-positief gen
- Bevat de stof Larotrectinib.

## Hoe werkt Vitrakvi?

- Voor patiënten waarbij de ziekte het gevolg is van een fout in het gen NTRK. Door deze fout wordt een abnormaal eiwit gevormd dat de groei van kankercellen bevordert.
- Vitrakvi blokkeert de werking van het eiwit en vertraagt zo de groei en verspreiding van kankercellen.

## Hoe wordt Vitrakvi toegediend?

- Harde capsule met een dosis van 100 mg (wit-blauwe kleur)
- Aanbevolen dosis is 200 mg (= 2 capsules)
- 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip
- Mogen ingenomen worden met voedsel
- Capsules in zijn geheel innemen met water, niet op bijten of fijnmaken.
- Bij braken na doorslikken capsules, geen nieuwe nemen, maar wachten tot volgende geplande dosis.

## Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts hiervan op de hoogte te stellen, zo kan er nagegaan



worden of er een wisselwerking zou kunnen optreden.

## Mogelijke bijwerkingen

- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust
- Misselijkheid / Braken
- Spierpijn en zwakte
- Gevoeligheid voor zonlicht , gebruik steeds zonnecrème met beschermingsfactor 50+
- Afwijkende bloedsuitslagen lever- en nierfunctie
- Obstipatie / Diarree
- Invloed op bloedcellen (anemie)
- Gewichtstoename

## Nabehandeling thuis en praktische info

- **Inname van pompelmoes en pompelmoessap is verboden, anders kan dosis Vitrakvi zo hoog worden dat ze schadelijk is voor gezondheid.**
- Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Orale anticonceptie zal zijn werkzaamheid verliezen bij inname van Vitrakvi dus gebruik er een ander voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Ook hoelang is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit in een potje en neem ze dan in.
- Door problemen met duizeligheid kunt u best geen voertuigen of machines besturen.
- In geval van koorts van meer dan 38° C steeds contact op te nemen met zorgverlener.
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje)