

# Immunotherapie Opdivo (Nivolumab)

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

## Wat is Opdivo ?

- Dit is een therapie die uw immuunsysteem versterkt en activeert zodat het afweersysteem de kanker aanvalt.
- Het stimuleert het immuunsysteem zodat dit op een krachtige wijze de kankercellen kan herkennen en vernietigen.

## Hoe werkt Opdivo ?

- Het is een soort eiwit dat als doel heeft een antigeen in bepaalde lichaamcellen te herkennen en zich daar aan te binden.
- Het schakelt de werking uit van de bepaalde cellen, waardoor het immuunsysteem wordt verbeterd en het kankercellen kan vernietigen.

## Hoe wordt Opdivo toegediend ?

- De dosis bedraagt 3 mg/kg voor Opdivo
- Het product wordt toegediend via een infuus in een ader of PAC en loopt in gedurende half uur.
- Om de 3 weken krijgt u een behandeling via dagziekenhuis.
- Voor en na de toediening van Opdivo wordt er nog een spoelinfluus aangehangen.

## Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem, soms zorgt dat ervoor dat afweersysteem het eigen lichaam gaat aanvallen en dus bepaalde organen ontstoken kunnen geraken.
- Ontsteking van de darmen met buikpijn of diarree als gevolg (waterige, dunne of zachte ontlasting)
- Vermoeidheid en algemeen zwak voelen
- Ontsteking van de huid met huiduitslag en jeuk
- Verminderde eetlust
- Ontsteking van de longen met hoest en ademhalingsproblemen
- Ontsteking van de zenuwen, met tintelingen
- Verhoogde bloedsuikerspiegels
- Problemen met hormoonproducerende klieren (schildklier, bijniere...)

## Nabehandeling thuis en praktische info

- Als u één van de bovenstaande verschijnselen hebt, moet u onmiddellijk uw arts of verpleegkundig consulent contacteren (zie telefoonlijst in uw informatiemapje)
- Als uw bijwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
- Voor elke toediening is er een bloedafname gepland.
- Na 2 toedieningen is er een CT thorax.
- Na verloop van tijd gebeurt de CT-controle om de 9 weken.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- **Bij een verhoging boven de 38 graden Celsius moet u contact opnemen met uw huisarts!**
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw informatiemapje)