

# Chemotherapie Lomustine

Beste patiënt

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De dienst oncologie

## Wat is Lomustine

Deze chemotherapie bestaat uit capsules Lomustine, deze worden via de mond ingenomen.

Lomustine is een cytostatisch geneesmiddel. Dit betekent dat het de groei van cellen in het lichaam remt.

Het is een therapie die om de 6 weken plaatsvindt

## Hoe moet Lomustine worden ingenomen?

Lomustine bestaat onder de vorm van capsules van 40 milligram. Uw arts schrijft het nodige aantal voor. De tabletten moeten samen op hetzelfde moment van de dag worden ingenomen met een glas water.

## Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- **Misselijkheid**

Lomustine kan misselijkheid veroorzaken. Daarom krijgt u smelttabletten Zofran om deze misselijkheid tegen te gaan.

- **Daling witte bloedcellen**

Lomustine kan een daling teweegbrengen van de bloedcellen, vooral van de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. De witte bloedcellen beschermen ons normaal tegen infecties.

- Lomustine kan deze witte bloedcellen doen dalen en op die manier het risico op infecties doen toenemen. Het is daarom uitermate belangrijk om **bij koorts (temperatuur van meer dan 38 graden C) of bij infectie steeds onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelend arts in het ziekenhuis.**
  - **Minder goede stolling van het bloed**  
De bloedplaatjes zorgen voor een goede stolling van het bloed. Lomustine kan deze bloedplaatjes doen dalen waardoor het bloed minder goed kan stollen en er gemakkelijker bloedingen kunnen optreden.  
Het is daarom uitermate belangrijk om bij **tekenen van bloeding** (bloedend tandvlees, neusbloeding) **onmiddellijk contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis.**
- Vraag ook aan uw huisarts om een tussentijds bloed te controleren met een bloedafname.
- **Zwelling en pijn in de mond, ontsteking van het tandvlees, de lippen en de keel**
  - **Vermoeidheid**

## Nabehandeling thuis en praktische info

Als de resultaten van uw bloedafname niet goed zijn of als de nevenwerkingen voor u te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in uw infomapje.