

Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxotere?

- Het bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Voor patiënten met een longkanker

Hoe werkt Taxotere?

- Taxanen zoals docetaxel verstoren de celstructuur waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt.
- In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren.
- Deze buisjes maken deel uit van het ‘geraamte’ van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.
- Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken.
- Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Taxotere toegediend?

- De therapie wordt via het oncologisch dagziekenhuis toegediend.
- U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.
- U zal normaal om de 3 weken therapie krijgen.
- Meestal zullen 4 tot 6 cycli gegeven worden (afhankelijk van resultaat en hoe goed u de behandeling verdraagt)
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter/ PICC.
- Aangezien de therapie broosheid en afbrokkelen van



nagels kan veroorzaken is het belangrijk uw nagels en nagelriem vooraf goed in te smeren met een hydraterende crème.

- Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1 Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal alsook de ochtend van de opstart van de therapie !!
- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om misselijkheid te voorkomen. (Litican 2 comprimés)
- Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt)
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Vochtophopping in de weefsels (zwellen handen, voeten, benen...)
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree / obstipatie
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoelighedsreacties tijdens inlopen product (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en ook een hoofddekseel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer,

is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken.

- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema. (Litican)
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen vindt u in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)