

Leverbiopsie en echogeleide punctie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Binnenkort moet u een leverbiopsie ondergaan. Deze folder vertelt u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek.

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan geven wij u graag meer uitleg.

We wensen u een goed herstel toe.

De artsen en verpleegkundigen van de dienst endoscopie

1

Doel van het onderzoek

Bij een leverbiopsie wordt met een fijne biopsienaald een klein stukje weefsel uit de lever weggenomen om te onderzoeken of er in de lever schade en/of een ontsteking aanwezig is en wat de eventuele oorzaak hiervan is.

Met een leverbiopsie kunnen veel verschillende leveraandoeningen vastgesteld worden.

- Leververvetting, leverfibrose (bindweefselvorming), levercirrose
- Leverontsteking door een virus of door een andere ziekte
- Opstapeling van koper (ziekte van Wilson) of ijzer (hemochromatose)
- Ook kan een tumor worden aangeprikt onder echogeleide

Meld op de voorafgaande raadpleging en voor de start van het onderzoek:

- eventuele allergieën
- inname van ontstekingswerende of bloedverdünnende medicatie bv : aspirinebevattende preparaten Plavix, Marcoumar, Clopidogrel, Ticlid, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Brilique, Marevan, Sintrom... Deze dienen eventueel vooraf aan de biopsies te worden gestopt. Hoe lang op voorhand verneemt u van uw arts. Zo nodig wordt deze periode overbrugd met bloedverdünnende spuitjes.
- inname van ontstekingsremmers

2

Vorbereiding

1. U moet minstens 6 uur voor het onderzoek **nuchter** zijn. Dit wil zeggen niet eten, drinken of roken .
2. Op de kamer zal er, indien nodig, nog een bloedafname

- gebeuren om de stolbaarheid van het bloed te controleren.
3. Gebruik voor het onderzoek nog eens het toilet. Er zal een patiëntenschort klaarliggen die u mag aantrekken.

3

Verloop van het onderzoek

- Voor dit onderzoek ligt u op de rug met de rechterarm achter het hoofd.
- Allereerst bepaalt de arts de juiste plaats voor de afname van de biopsie met een echotoestel en wordt de aanprikplaats gemarkeerd en ontsmet.
- De huid wordt nu plaatselijk verdoofd en daarna maakt de arts een kleine insnede.
- Met een speciale biopsienaald neemt de arts een stukje weefsel weg.
- Soms wordt er een 2^{de} of 3^{de} maal geprikt.
- Dit onderzoek wordt niet echt als pijnlijk ervaren.
- De aanprikplaats wordt dan afgedekt.

4

Nazorg

Onmiddellijk na het onderzoek

- U moet minstens 2 uur op de rechterzijde gaan liggen om zo wat extra druk uit te oefenen op de aanprikplaats en zo het risico op nabloeden te beperken.
- Daarna nog 2 uur bedrust (behalve voor het gebruik van het toilet).
- 3 uur na het onderzoek mag u weer eten.
- De verpleegkundige zal op regelmatige basis uw bloeddruk en pols nemen.
- Indien nodig zal u gebruik moeten maken van een urinaal of de bedpan.
- Na de leverbiopsie kunt u pijn voelen in de bovenbuik of rechterschouder, soms toenemend bij diep ademen. U meldt dit dan best aan de verpleegkundige.
- Vaak wordt er een overnachting gepland.

De volgende dagen

- De arts schrijft eventueel nog pijnmedicatie voor.
- Vermijd de eerste paar dagen het tillen van zware lasten.
- Neem geen bad de eerste 4 dagen als gevolg van de kleine insnede die gemaakt werd. Douchen vormt geen probleem.

5 Wanneer een arts raadplegen na thuiskomst?

Wanneer u zich ergens zorgen over maakt of u hebt toenemende buikpijn, zwarte stoelgang of koorts is het aangewezen een arts te raadplegen.

6 Risico's van het onderzoek

Door de punctie kan bloed- of galverlies in de buik ontstaan. In zeldzame gevallen moet het punctiegaatje in de lever via een kijkoperatie worden genaaid. Het risico op bloeding (ook kleine) is minder dan 1 op 1000.

7 Resultaten van het onderzoek

U zal een nieuwe afspraak krijgen bij de raadpleging voor de bespreking van de resultaten. De uitslag van het weefselonderzoek is immers niet meteen beschikbaar.

8 Kostprijs

Bij de leverbiopsie wordt 'single use'-materiaal (steriel materiaal voor éénmalige toepassing) gebruikt. In functie van uw **kamerkeuze** zullen kamersupplementen (eenpersoonskamer) en ereloonsupplementen worden aangerekend. De artsen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven. Een prijsindicatie kan worden opgevraagd via de dienst facturatie

(factuur@azdelta.be of 051 23 70 54).

De factuur wordt opgemaakt via het ziekenhuis, in samenspraak met uw verzekeraar (derdebetalersregeling). Pas over enkele weken zal u gevraagd worden het nog verschuldigd bedrag te betalen.

Notities

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

Contact

Dienst endoscopie

ROESELARE

t 051 23 72 03

MENEN

t 056 52 22 43

TORHOUT

t 050 23 24 01

www.azdelta.be

Bron: dienst endoscopie, 12 oktober 2018

Artsen

Dr. Filip Baert

Dr. Marc Cabooter

Dr. Filip De Pauw

Dr. Dominiek De Wulf

Dr. Jochen Decaestecker

Dr. Joost Deprez

Dr. Lobke Desomer

Dr. Jef Dewyspelaere

Dr. Luc Harlet

Dr. François Marolleau

Dr. Pieter Vandecandelaere