

# Maagevacuatietest



**azdelta**

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze folder over maagevacuatiescintigrafie of maagevacuatietest geven we u meer uitleg over wat we hiermee precies onderzoeken en hoe het onderzoek verloopt. U vindt hier ook wat meer informatie over wat we van u verwachten om het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Het nemen van de maagevacuatietest is veilig en pijnloos. Zijn er nog bepaalde zaken onduidelijk, stel ons gerust al uw vragen. Wij geven u graag antwoord.

Het team nucleaire geneeskunde

## 1 Doel van het onderzoek

Een maagevacuatietest is een onderzoek naar de werking van de maag. U krijgt een proefontbijt aangeboden waaraan een kleine hoeveelheid radioactiefgemerkte stof is toegevoegd. Gedurende twee uur nemen we om het half uur foto's van uw maag, die ons informatie geven over de snelheid waarmee het voedsel door de maag passeert.

## 2 Verloop van het onderzoek

- Voor dit onderzoek dient, u **volledig nuchter** te zijn. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf middernacht niet meer mag eten, drinken of roken.
- U krijgt een proefontbijt waaraan een kleine hoeveelheid radioactiefgemerkte stof is toegevoegd, als onderdeel van het onderzoek. Na het ontbijt worden onmiddellijk twee foto's van de maag genomen terwijl u op de cameratafel ligt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- Na de wachttijd van een half uur maken we opnieuw dezelfde foto's. Op die manier maken we gedurende twee uur om het half uur foto's. De wachttijd kunt u doorbrengen in de wachtzaal. Het is belangrijk dat u tussenin ter plaatse blijft en niets eet of drinkt en niet rookt. U brengt het best

een boek of wat tijdschriften mee. Tegen de middag is het onderzoek volledig afgelopen.

## 3 Resultaat van het onderzoek

De arts-nuclearist beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek, voor u de afdeling verlaat en maakt een verslag op. Dit verslag wordt doorgezonden naar uw arts. Hij/zij zal u het resultaat van het onderzoek meedelen en indien nodig de gepaste therapie starten.

Uw foto's zijn digitaal beschikbaar op PACSonWEB via <http://rx.azdelta.be>. Om deze te bekijken vraagt u het best het referentienummer aan de verpleegkundige.

## 4 Veiligheid en straling

- Het is niet aan te raden om een maagevacuatietest uit te voeren tijdens de zwangerschap! Laat dus zeker vooraf weten aan de verpleegkundige als u zwanger bent of zou kunnen zijn.
- Verwittig ons zeker als u borstvoeding geeft. Enkele maatregelen zijn belangrijk om bestraling bij de pasgeborene te beperken. Vooraf afkolven en de baby gedurende 24 uur na het onderzoek niet aanleggen kan een oplossing zijn. De verpleegkundige geeft u zeker bijkomende informatie.
- De gebruikte radioactiviteit wordt steeds zo laag mogelijk gehouden zodat het risico op eventuele neveneffecten verwaarloosbaar is en niet opweegt t.o.v. de diagnostische info die het onderzoek oplevert. De stof zendt slechts een korte tijd straling uit en is na 1 dag praktisch volledig uit het lichaam verdwenen. Daarom is het beter om de eerste 12 uur na het onderzoek langdurig nauw contact met baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen te vermijden. De gewone verzorging mag uiteraard wel.

# 5

## Kostprijs

Met vragen i.v.m. de kostprijs van dit onderzoek kunt u steeds terecht bij de dienst facturatie op 051 23 77 43.

### Uw afspraak voor een maagevacuïetetest

Op ..... / ..... / ..... om ..... uur

## Contact

Dienst nucleaire geneeskunde  
t 051 23 77 43

### Artsen

Dr. Kristien Casier  
Dr. Liesbet De Ceuninck  
Dr. Nele Lips  
Dr. Kristoff Muylle  
Dr. Evelyn Vranken

[www.azdelta.be](http://www.azdelta.be)

*Bron: dienst nucleaire geneeskunde, 14 maart 2019*