

Medicatie IBD - Risankizumab (Skyrizi®)

Wat is Risankizumab?

Patiënten met een inflammatoire darmziekte hebben een verhoogde ontstekingsreactie in de darm. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door cytokines. Dit zijn eiwitten die onze witte bloedcellen aansturen om ontsteking te veroorzaken of te onderhouden. Risankizumab gaat specifiek 1 cytokine afremmen met name IL-23 en zo de ontstekingsreactie in de darm doen afnemen.

Vorbereiding opstart

Voor de behandeling start, controleren we of u geen actieve of chronische infecties doormaakt (zoals hepatitis, CMV, EBV...). We controleren u ook op (in)actieve tuberculose. Voor deze controle kijken we naar uw **persoonlijke voorgeschiedenis** en bespreken we eventueel vroeger contact met tuberculose. Daarnaast nemen we een **röntgenfoto (RX) van de longen** en plannen we een **tuberculinehuidtest** (prikje onder de huid) **of een bloedafname** (IGRA-test).

- Als u de **ziekte van Crohn** hebt, dan wordt er voorafgaand aan de opstart van de behandeling steeds een stoelgangstest gedaan om calprotectine te bepalen. We plannen een darmonderzoek of NMR entero in als dat niet recent gebeurd is.
- Als u **colitis ulcerosa** hebt, plannen we voor de start van de behandeling een beperkt darmonderzoek in. Het gaat om een linkercoloscopie waarbij het laatste stuk van de darm (rectum en/of endeldarm) wordt onderzocht. Dit gebeurt zonder verdoving. Dit onderzoek is nodig voor de terugbetaling van risankizumab.

Fazes behandeling

Opstartfase

De opstart gebeurt aan de hand van 3 infusen, die worden ingepland op week 0, week 4 en week 8.

Voor deze toedieningen moet er een dagopname gepland worden in het dagziekenhuis. Risankizumab wordt dan via een infuus rechtstreeks in de ader toegediend. Dit is een vaste dosis van 600 mg die over 1 uur tijd inloopt.

Op 8 tot 12 weken na de opstart volgt het eerste evaluatiemoment.


- Voor de **ziekte van Crohn** gaan we controleren met een nieuwe stoelgangtest op calprotectine. Graag hebben we de uitslag van deze test voorafgaand aan de raadpleging op week 8.
- Voor **colitis ulcerosa** moet er een nieuwe linkercoloscopie worden ingepland.

Werkwijze voor de infusen

- Meld u bij aankomst aan bij de kiosk (ingang van het ziekenhuis). Hier krijgt u de klevers en wegbeschrijving naar het ziekenhuis.
- U gaat naar het dagziekenhuis oncologie (2de verdieping, kamers 600-699). Meld u daar aan bij het secretariaat. U krijgt er een zetel toegewezen.
- Voor de toediening van ieder infuus is er een standaard bloedafname gepland.
- Na de bloedafname worden de leidingen voor het infuus en de medicatie aangeschakeld.
- Na het inlopen van de medicatie moet er nog 10 minuten worden nagespoeld.

Als u komt voor een infuus kunt u ‘ingang oost’ gebruiken. Dit is een aparte oprit, parking en ingang van het ziekenhuis specifiek voor patiënten die komen voor hun infuus.

Risankizumab wordt opgestart in het dagziekenhuis. Om een vlotte werking te garanderen vragen we om **minimum 1 uur voor het afgesproken tijdstip** te telefoneren naar het dagziekenhuis op het nummer 051 23 76 70.



Onderhoudsfase



Op week 12 wordt er gestart met een insputing van risankizumab 360 mg die om de 8 weken moet worden toegediend. De toediening van risankizumab gebeurt aan de hand van een On-Body-Injector (OBI).

De IBD-verpleegkundige legt u uit hoe u de OBI precies moet gebruiken. Het wordt aangeraden om deze eerste toediening op week 12 samen met de IBD-verpleegkundige te zetten. Nadien kunt u de OBI zelfstandig thuis toedienen. Als u zich na de eerste toediening onzeker voelt, dan kunt u op het moment van de volgende toediening opnieuw een raadpleging met de IBD-verpleegkundige inplannen.

Jaarlijks moet er een terugbetaling worden aangevraagd bij uw ziekenfonds. Hou de vervaldatum van het attest in de gaten zodat we dit op tijd kunnen vernieuwen.

Nuttige info

- Risankizumab is licht- en warmtegevoelig. Daarom moet de verpakking **gesloten** bewaard worden in de **koelkast** (tussen 2 en 8 graden). Risankizumab moet minimum 45 minuten en maximaal 24 uur uit de koelkast zijn genomen vóór de toediening.
- U neemt de medicatie best mee in een koeltasje van de apotheek naar huis.
- Een gebruikte OBI moet in een naaldcontainer worden weggegooid. Een volle naaldcontainer kunt u naar het containerpark brengen. Een nieuwe naaldcontainer kunt u aankopen in de apotheek, thuiszorgwinkel of online.
- Als u met het vliegtuig op reis gaat dan kunt u een ‘reispasje’ laten invullen door uw arts. Hierop staat vermeld dat u de medicatie kunt meenemen in de handbagage op het vliegtuig. De medicatie mag niet in uw grote bagage, in het luchtruim, omdat de temperatuur daar te koud is en de medicatie kapot gaat.

Te verwachten effect

Na het tweede infuus kan er al een beginnend effect worden waargenomen. Na 8 weken moet er een duidelijk effect zijn vooraleer er wordt verder gegaan met de medicatie via de OBI.

Mogelijke bijwerkingen

- Licht verhoogde gevoeligheid voor infecties (bv. bovenste luchtweginfecties)
- Hoofdpijn
- Lokale huidreactie na de inspuiting
- Schimmelinfectie van de huid


Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Enkele bijzonderheden

- Voorafgaand aan de start van de behandeling raden we aan om vaccinaties tegen hepatitis B, tetanus en pneumokokken in orde te brengen.
- Een jaarlijks griepvaccin wordt sterk aangeraden.
- Tijdens de behandeling met risankizumab mogen geen levende vaccins gegeven worden (bv. gele koorts of Bof-Mazelen-Rubella vaccin).
- Als u rookt, adviseren we u een rookstopbegeleiding

Medicatie schema



Tijdschema

	Datum	Planning
VOOR START		Gesprek met IBD-verpleegkundige Screening voor infecties en tuberculose: <ul style="list-style-type: none"> • Anamnese • Röntgenfoto van de longen • Tuberculinetest (mantoux) en bloedafname OF bloedafname met IGRA-test <i>Ziekte van Crohn</i> : calprotectine <i>Colitis ulcerosa</i> : linkercoloscopie
WEEK 0		Toediening eerste infuus
WEEK 4		Toediening tweede infuus + raadpleging van IBD-verpleegkundige in het dagziekenhuis
WEEK 8		<i>Ziekte van Crohn</i> : raadpleging bij arts met voorafgaand calprotectine test <i>Colitis ulcerosa</i> : linkercoloscopie Toediening derde infuus Terugbetalingsattest voor het ziekenfonds
WEEK 12		Eerste toediening met OBI onder begeleiding van IBD- verpleegkundige
WEEK 20		Tweede toediening met OBI
Eerste jaar na start	maand 6 - 9 - 12	3-maandelijkse raadpleging bij arts telkens met het lab en om de 6 maanden calprotectinetest
Eén jaar na opstart		<i>Ziekte van Crohn</i> : controle coloscopie of NMR entero
Tweede jaar na start		6-maandelijkse raadpleging bij arts met het lab en calprotectine