

Onderzoek bijnieren met de ACTH-test



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U zal in het kinderdagziekenhuis een ACTH-test ondergaan. Op deze manier onderzoekt de arts of de bijniëren goed werken. U vindt meer info in deze brochure en u kunt met uw vragen altijd bij de arts terecht.

De dienst kinderziekten

Wat is ACTH?

ACTH is een afkorting van 'Adrencorticotroop Hormoon'. Dit hormoon wordt door de hypofyse - een klier die in een holte onder uw hersenen ligt - geproduceerd en stimuleert de bijniëren om stress- en geslachtshormoon aan te maken. De hypofyse is een klier onder uw hersenen, zo groot als een erwt. Als de hypofyse niet goed genoeg werkt, kan er een tekort aan groeihormoon ontstaan.

Stresshormoon is altijd in uw lichaam aanwezig. Bij ziekte of stress wordt er extra stresshormoon aangemaakt. Het geslachtshormoon zorgt voor de groei van schaamhaar en okselhaar. Meestal zal uw lichaam rond de pubertijd duidelijk meer geslachtshormoon aanmaken.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een ACTH-test te doen. Ten eerste kunnen we ermee onderzoeken of uw lichaam voldoende stresshormoon aanmaakt. Daarnaast kunnen we nagaan of de bijnier de geslachtshormonen in de juiste verhoudingen produceert volgens de leeftijd.

Nuchter zijn?

Voor het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Als u extra medicatie neemt, mag u deze geneesmiddelen innemen met een slokje water.

Hoe gebeurt de test?

De test gebeurt door een verpleegkundige van het kinderdagziekenhuis. Hij of zij zal een infuus plaatsen door een prik in uw hand of arm. Een infuus is een dun plasticen buisje dat in het bloedvat blijft zitten. Op deze manier kan de verpleegkundige op verschillende tijdstippen bloed nemen zonder dat er opnieuw moet worden geprikt. Desgewenst kan er een verdovende pleister (Rapydan®) worden gebruikt op de plaats waar geprikt wordt.

Vervolgens zal de verpleegkundige bloed afnemen en het geneesmiddel Synacthen® toedienen via het infuus. Daarna mag u met het infuus naar de kamer. Een uur later zal de verpleegkundige nogmaals bloed afnemen.

Het onderzoek duurt in totaal 1 uur.

De uitslag

Na de test wordt het infuus verwijderd en mag u naar huis. U zal helemaal niets voelen van de test. 3 weken na de test kunt u contact opnemen met het secretariaat van de arts om de resultaten van de test en de volgende stappen te bespreken.

Bijwerkingen

U wordt niet ziek van een ACTH-test. In heel zeldzame gevallen kan een allergische reactie op Synacthen® voorkomen.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de dienst facturatie 051 23 39 89 via factuur@azdelta.be.

Contact

Dienst kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 23 41

www.azdelta.be

www.kinderafdeling.azdelta.be

Bron: dienst kindergeneeskunde

Kinderartsen

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat

t 051 23 63 94

CAMPUS MENEN

Secretariaat

t 056 53 05 33 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John & dr. Shady Al Hanini)

t 057 33 36 03 (Dr. Peter Boucquey)

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat

t 050 23 24 34