

Peritoneaal dialysekatheter: hoe draag ik er zorg voor?



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Door een sterk verminderde nierfunctie is het nodig om binnenkort een nierfunctievervangende therapie op te starten of is dit ondertussen al opgestart.

Wanneer u kiest voor peritoneale dialyse, moet er een toegangsweg gemaakt worden in het lichaam via een dialysekatheter: een buisje in de buik. In deze folder vindt u meer info over wat dit precies inhoudt.

Hebt u nood aan bijkomende informatie, aarzel niet om contact op te nemen met de dienst peritoneale dialyse. U vindt de contactgegevens op de achterkant van deze brochure.

De dienst nierziekten

1 Omschrijving

Een peritoneaal dialysekatheter is een soepel buisje dat via een kijkoperatie geplaatst wordt in het diepste van de buik. De ingreep gebeurt onder algemene anesthesie en duurt ongeveer 30 minuten.

2 Katheterzorg

Een katheterverband dient 3 keer per week ververs te worden. Dit kunt u zelf of kunt u door uw partner of thuisverpleegkundige laten doen. Er wordt u aangeleerd hoe u de verbandzorg correct moet uitvoeren en op welke tekenen u moet letten om infectie vroegtijdig op te sporen.



Voorbeeld van een katheterverband.



Voorbeeld van een riem om geen druk op de PD-katheter te hebben.

Let op:

- **NOOIT** trekken aan de katheter. Wees voorzichtig bij elke handeling.
- **NOOIT** krabben aan de insteekplaats van de katheter (= huidpoort).
- **ALTIJD** de katheter veilig wegbergen onder de kledij.
- **ALTIJD** de wisseling peritoneale dialyse volgens de aangeleerde methode uitvoeren.
- **ALTIJD** het verband volgens de aangeleerde methode uitvoeren. Bij douchen de insteekplaats en de katheter zorgvuldig drogen vooraleer de verbandzorg uit te voeren.
- **ALTIJD** het uitgelopen vocht van de peritoneale dialyse controleren op helderheid. Troebel uitzicht kan wijzen op ontsteking van het buikvlies (= peritonitis). In dat geval moet u uw verpleegkundige in het ziekenhuis onmiddellijk verwittigen.
- **ALTIJD** bij koorts (meer dan 38°C), jeuk, pijn, spierzwakte... uw verpleegkundige verwittigen.
- **ALTIJD** bij roodheid, etter, gezwollen katheterinsteek, uw verpleegkundige verwittigen.

3

Douchen

Met een peritoneaal dialysekatheter is het door infectiegevaar, afgeraden om te zwemmen of een bad te nemen. Douchen is pas toegestaan als de plaats waar de katheter is geplaatst, volledig genezen is en na toestemming van de arts. Belangrijk is dat na het douchen, de katheterzorg onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Contact

Peritoneale dialyse

☎ 051 23 74 64

✉ PDverpleegkundigen@azdelta.be

www.azdelta.be

Bron: dienst nierziekten

Artsen

Dr. Gert De Schoenmakere

Dr. Bart Maes

Dr. Thomas Malfait

Dr. Hans Schepkens

Dr. An Vanacker

Dr. Ignace Vandewiele