

# Prostaatpuncties



**azdelta**

Uw ziekenhuis.

## Beste patiënt

U ondergaat binnenkort een onderzoek waarbij het nodig is prostaatweefsel via punctie af te nemen. In deze brochure geven we er u meer informatie over. Als u vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

## De artsen en medewerkers van de dienst urologie

Voor dit onderzoek verwachten wij u op .....dag ...../  
...../..... om ..... uur

Aan de inschrijvingskiosk van het onthaal neemt u de stickers mee. Daarna meldt u zich aan bij het secretariaat urologie.

Kunt u de afspraak niet nakomen, verwittig dan graag ten laatste de dag voordien:

campus Roeselare op het nummer 051 23 70 08

campus Menen op het nummer 056 52 25 78

campus Torhout op het nummer 05023 24 36

# 1

## Wat?

Een prostaatpunctie is nodig om kwaadaardigheid van prostaatweefsel aan te tonen of uit te sluiten.

Er zijn hiervoor 2 procedures.

### Procedure 1

De arts zal onder echogeleide via de endeldarm met een dunne holle naald weefsel afnemen. Dit kan zich meerdere keren herhalen. Nadien kunt u het ziekenhuis verlaten.

### Procedure 2

De arts zal onder echogeleide via het perineum (zone tussen balzak en de endeldarm) met een dunne naald weefsel afnemen. Dit kan zich meerdere keren herhalen. Nadien kunt u het ziekenhuis verlaten.

# 2

## Vorbereiding

- U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek.
- Ter preventie van een infectie krijgt u vooraf een voorschrift mee om tijdig antibiotica op te starten en dit volgens advies van de arts.
- Neem 1 uur voor de puncties een Dafalgan van 1 gr, indien geen tegenindicatie.
- Indien u bloedverdunners neemt zal de arts u erop wijzen wanneer u die moet stoppen.
- Best niet met de fiets naar het onderzoek komen.
- Leg een inlegkruisje in de slip om eventueel nabloeden op te vangen (bij procedure 1).

# 3

## Onderzoek

### Procedure 1, via de endeldarm

Voor het onderzoek vragen we u uw onderkledij uit te doen en plaats te nemen op de onderzoekstafel, op uw linkerkant. Vooraleer te beginnen brengt de verpleegkundige een zalf in, via de endeldarm, die dient als plaatselijke verdoving. Daarna zal de arts onder echogeleiding via de endeldarm met een dunne holle naald prostaatweefsel afnemen.

### Procedure 2, via het perineum

Voor het onderzoek vragen we u uw onderkledij uit te doen en plaats te nemen op de onderzoekstafel, in gynaecologische houding. Vooraleer te beginnen zullen we eerst plaatselijk verdoven. Daarna zal de arts onder echogeleiding, via het perineum met een dunne holle naald prostaatweefsel afnemen.

Belangrijk hierbij is dat u zich **goed ontspant**. Een hulpmiddel hierbij kan zijn om eens goed diep in en uit te ademen ofwel geven wij u medicamenteuze ondersteuning, mocht dit nodig zijn.

Het aantal puncties is afhankelijk van de grootte van de prostaat, of men iets voelt, of men iets ziet op echo of medische beeldvorming, dan kan men gerichter prikken.

Na het nemen van de weefselstalen is het onderzoek afgelopen en mag u zich weer aankleden.

Het onderzoeken van het weefsel vraagt zijn nodige tijd, daarom zullen de resultaten u tijdens een volgende visite worden meegedeeld, dit meestal na een week.

# 4

## Nazorg

- Verder nemen van de voorgeschreven antibiotica volgens advies van de arts.
- Als gevolg van het onderzoek kunnen bepaalde symptomen aanwezig zijn:
  - **bloedverlies via urine:** klaart steeds spontaan op, waarbij aangeraden wordt veel te drinken.
  - **bloedverlies via stoelgang:** klaart steeds spontaan op. Niet van toepassing bij procedure 2.
  - **bloedverlies bij zaadlozing:** dit uit zich meestal als een donkere zaadlozing maar dit gaat spontaan over na geruime tijd.
- Ongeveer een week na het nemen van de punctie verwachten we u terug voor een controle.

# 5

## Risico's en neveneffecten

Urineweginfectie/ prostaatontsteking: ter voorkoming van een urineweginfectie (met koorts) krijgt u antibiotica. Mochten er na een paar dagen toch duidelijke klachten blijven met pijnlijke en branderige plasbeurten moet zeker de huisarts of de behandelende uroloog gecontacteerd worden.

# 6

## Neem contact op bij

- **koorts**

Dit wijst meestal op een ernstige infectie waarbij onmiddellijke therapie moet opgestart worden.

### Belangrijk

Bij blijvende koorts ondanks ingestelde behandeling of temperatuur van meer dan 38,5°C meldt u zich best via de spoedgevallendienst in het ziekenhuis aan voor verder onderzoek of behandeling.

- **veel pijn**

Dit komt slechts bij een minderheid van de patiënten voor en gaat meestal spontaan en vrij snel over. Een gewone pijnstiller zoals Dafalgan® volstaat meestal.

- **bloed met klonters bij het plassen**
- **niet kunnen plassen**

# 7

## Kostprijs

Als u wenst te weten hoeveel het onderzoek u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 76 66 of mailen naar [factuur@azdelta.be](mailto:factuur@azdelta.be)

# Notities

A series of 20 horizontal dotted lines, evenly spaced, intended for writing notes.

# Contact

Secretariaat dienst urologie

## **CAMPUS RUMBEKE**

**t** 051 23 70 08

## **CAMPUS MENEN**

**t** 056 52 25 78

## **CAMPUS TORHOUT**

**t** 050 23 24 36

[www.azdelta.be](http://www.azdelta.be)

*Bron: info dienst urologie*

# Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Jasper Decoene

Dr. Lieven Goeman

Prof. dr. Steven Joniau

Dr. Heleen Maes

Dr. Wim Van Haute

Dr. Lieven Verhamme