

Stoppen met maagzuurremmers (artsenfolder)



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste huisarts

Via deze informatiefolder wensen we meer informatie en richtlijnen mee te geven m.b.t. verschillende indicaties voor chronisch gebruik, ongewenste effecten, afbouwschema's en rebound zuurbranden van maagzuurremmers (protonpompinhibitoren).

Daarnaast werd ook een patiëntenfolder ter motivatie tot afbouw/stop opgemaakt die op de website van AZ Delta terug te vinden is onder <https://www.azdelta.be/nl/patient/medische-informatie/brochures/geneesmiddelen>.

Het team apotheek AZ Delta

1. Indicaties chronisch gebruik

- Preventie van nieuwe ulcera
- Preventie van ulcera door NSAID gebruik bij risicopatiënten: enkel gedurende de inname van NSAID, erna stop
RISICOPATIËNT:
 - > 65 jaar
 - Belangrijke comorbiditeit
 - Antecedenten van (peptische) ulcera (=contra-indicatie)
 - NSAID + corticoïden
 - NSAID + acetylsalicylzuur
 - NSAID + ander antiplaquettair middel
 - NSAID + anticoagulans (coumarine of ander)
- Behandeling refluxoesofagitis graad C & D (endoscopisch vastgesteld)

2. Ongewenste effecten

- Malabsorpties van ijzer, vitamine B12, magnesium, calcium...
- Verhoogd risico op *Clostridium difficile* infecties
- Verhoogd risico op osteoporose
- ...

3. Afbouwschema

U kunt bijvoorbeeld de dosis elke week verlagen met 50% tot de patiënt de laagst beschikbare dosering van het geneesmiddel inneemt.

Indien tweemaal per dag een maagzuurremmer ingenomen wordt, kunt u beginnen met enkel de inname voor het ontbijt te behouden en de tweede inname te schrappen. Eenmaal op de laagste dosering gedurende één week, kan de patiënt de behandeling stopzetten.

4. Rebound zuurbranden

Het is mogelijk dat na (plots) stoppen van de behandeling van een protonpompinhibitor (PPI), rebound zuurbranden optreedt. Mocht de patiënt tijdens het afbouwen klachten hebben over een terugkerend zuurbranden kan een antacidum (bv. Maalox Antacid[®], Gaviscon[®], Rennie[®], Riopan[®],...) gegeven worden wanneer nodig.

5. Bronnen

www.farmaka.be

www.riziv.be

www.bcfi.be

Contact

Hebt u nog vragen?

Contacteer de apotheek op

t 051 23 71 32