

Traitement d'hématologie : R-CVP



azdelta

Uw ziekenhuis.

Chère patiente, cher patient,

Cette brochure contient des informations sur votre traitement par R-CVP, la raison pour laquelle il vous est administré, son déroulement et ses effets secondaires possibles, ainsi que sur votre traitement ultérieur à domicile.

Si vous entrez en ligne de compte pour participer à une recherche scientifique (étude clinique), votre médecin et le coordinateur de l'étude attaché au centre de l'essai clinique vous fourniront de plus amples informations à ce sujet.

Nous vous souhaitons un bon traitement.

Les médecins et collaborateurs du service d'hématologie

1

Diagnostic

Le R-CVP est administré comme traitement du cancer des ganglions lymphatiques. Chez les personnes atteintes de ce cancer, un certain type de globules blancs (lymphocytes) se divise de manière incontrôlée, généralement dans un ganglion lymphatique, mais parfois aussi dans les intestins, les poumons ou la moelle osseuse, par exemple.

Le cancer des ganglions lymphatiques provoque souvent des **symptômes** généraux tels que de la fatigue. Les symptômes suivants peuvent également se manifester :

- gonflement indolore du cou, des aisselles ou de l'aîne
- poussées de fièvre
- sueurs nocturnes
- perte de poids
- confusion (cancer des ganglions lymphatiques dans le cerveau)
- douleurs gastriques (cancer des ganglions lymphatiques dans l'estomac)
- essoufflement (lymphome entre les poumons)

La cause du cancer des ganglions lymphatiques n'est pas connue.

Le risque de cancer des ganglions lymphatiques est plus élevé chez les patients qui :

- présentent un trouble immunitaire.
- sont atteints d'une maladie auto-immune.
- souffrent d'une infection (de longue durée) par certains virus ou bactéries.

Votre médecin pose le **diagnostic à partir d'un morceau de tissu** provenant d'un ganglion lymphatique ou d'un organe anormal (biopsie). Divers autres examens permettent de déterminer l'étendue de la maladie :

- analyse sanguine
- ponction de moelle osseuse
- scanner
- PET-scan

Le service d'hématologie collabore avec des associations de patients atteints d'un lymphome et peut vous fournir des informations ou vous mettre en contact avec ces associations.

Pourquoi ce traitement vous est-il administré ?

Le traitement qui vous convient le mieux dépend de la taille, de l'agressivité, de la nature exacte et de la localisation du lymphome. Votre médecin discutera des possibilités et déterminera le traitement adéquat avec vous :

- **chimiothérapie**
- autres médicaments tels que des anticorps, **immunothérapie**
- **radiothérapie** : traitement par irradiation
- **greffe de cellules souches**

Le service d'hématologie est fortement impliqué dans la **recherche scientifique**. De ce fait, vous avez dans de nombreux cas l'opportunité de participer à une étude clinique évaluant de tout nouveaux médicaments.

Parfois, plusieurs de ces traitements sont combinés.

Certains types de lymphome doivent être traités dès qu'ils sont diagnostiqués. Pour d'autres, cela n'est pas nécessaire et le traitement peut être reporté jusqu'à l'extension du lymphome. Votre hématologue pourra discuter de cette distinction avec vous.

Certains types de lymphome peuvent être guéris définitivement. D'autres ne disparaissent que de manière temporaire.



Qu'est-ce que le R-CVP ?

Types de médicaments

Votre traitement par R-CVP consiste à administrer les médicaments suivants :

1. **Rituximab** : perfusion (première administration) ou injections (administrations suivantes), thérapie par protéines
2. **Chimiothérapie ou médicaments inhibiteurs cellulaires** :
 - Cyclophosphamide : perfusion
 - Vincristine : perfusion
3. **Medrol**[®] : 32 mg : comprimé, corticostéroïde
4. **Aloxi**[®] : 250 µg : perfusion, contre les nausées et les vomissements
5. **Litican**[®] : 50 mg : comprimé, contre les nausées et les vomissements

Déroulement du traitement

Le R-CVP est administré en cycles de 3 semaines (21 jours). Votre médecin discutera avec vous du nombre de cycles. Huit cycles seront généralement administrés.

Chaque cycle comprend 1 jour (= jour 1) où le rituximab et la chimiothérapie sont administrés. Si votre état général le permet, vous ne devez pas être hospitalisé(e) et vous recevrez votre traitement à l'hôpital de jour.

Le **jour 1** est toujours le premier jour d'un nouveau cycle. Le cycle suivant commence en principe 3 semaines plus tard, à condition que vos résultats sanguins et votre état général le permettent.

Si ce n'est pas le cas, votre médecin peut décider de reporter le traitement d'une semaine ou d'en réduire le dosage.

Après les cures de R-CVP, il est possible que vous continuiez à recevoir le rituximab comme traitement d'entretien. Il est alors administré toutes les 8 semaines, dans la plupart des cas pendant 2 ans.

Représentation schématique d'un cycle :

Produit	Moment d'administration	Mode d'administration
Rituximab	Jour 1	Perfusion d'une durée d'environ 3 heures ou injection
Endoxan® (cyclophosphamide)	Jour 1	Perfusion d'une durée de 30 minutes
Vincristin® (vincristine)	Jour 1	Perfusion d'une durée de 15 minutes
Medrol® 32 mg	Jours 1, 2, 3, 4 et 5	2 comprimés par prise, avec le petit-déjeuner
Aloxi® 250 µg	Jour 1	Injection par perfusion

Vous recevrez également des comprimés de Litan® à emporter chez vous, que vous ne devez prendre qu'en cas de

nausées. Vous pouvez en prendre 4 à 6 fois par jour, environ 15 minutes avant le repas et éventuellement avant le coucher.

3

Effets secondaires possibles

Les effets secondaires les plus fréquents qui peuvent accompagner votre traitement sont notamment les suivants :

- fièvre
- myélosuppression pouvant entraîner une diminution des cellules sanguines et nécessitant parfois une transfusion
- augmentation de la sensibilité aux infections due à une diminution des globules blancs. Une hospitalisation à la suite d'une infection et l'administration d'antibiotiques puissants par perfusion peuvent être nécessaires.
- irritation de la muqueuse buccale
- chevelure moins dense et éventuellement perte de cheveux
- nausées et éventuellement vomissements
- altération du goût, généralement temporaire
- troubles de la vessie ressemblant à une cystite
- constipation
- fourmillements et/ou perte de sensibilité dans les doigts et/ou les orteils et/ou les pieds
- douleur dans les membres due à une irritation des nerfs
- fatigue, ces troubles peuvent persister (de manière temporaire) après la fin du traitement
- diminution de la résistance à l'effort
- diminution de la fertilité

Pour en savoir plus et obtenir des conseils utiles pour gérer au mieux ces effets secondaires, nous vous renvoyons à la rubrique « Informations concernant le traitement » du guide d'information.

4

Traitement ultérieur à domicile

- Jusqu'au jour 5 inclus, vous devez prendre des médicaments à domicile.

Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
2 comprimés de Medrol 32 mg	2 comprimés de Medrol 32 mg	2 comprimés de Medrol 32 mg	2 comprimés de Medrol 32 mg

- Le **jour 10**, nous vous demandons de faire réaliser un bilan sanguin par votre médecin généraliste. Le médecin généraliste peut ainsi évaluer si une transfusion sanguine est nécessaire et exclure la présence d'une infection.
- Pour quelques recommandations qui s'appliquent surtout durant la première semaine après l'administration de la chimiothérapie, nous vous renvoyons au guide d'information « À domicile après la chimiothérapie ».

5

Coût

Pour toute question concernant le coût du traitement, vous pouvez contacter le service financier en envoyant un message à factuur@azdelta.be ou en appelant le 051 23 76 66.

Vous avez d'autres questions ?

Si vous vous posez encore des questions ou si certaines choses ne vous semblent pas claires après avoir lu cette brochure d'information, n'hésitez pas à vous adresser à votre médecin ou à votre infirmier/ère conseiller/ère en hématologie. Il est important que vous receviez une réponse claire à toutes vos questions et que vous soyez donc correctement informé(e). Il va de soi que le traitement ne débutera qu'après votre accord.

Contact

CAMPUS RUMBEKE

Secrétariat d'hématologie

t 051 23 73 22

e secr.hematologie@azdelta.be

www.azdelta.be

Source : service d'hématologie

Médecins

Dr Dries Deeren

Dr Lien Deleu

Dr Caressa Meert