

Vaccinaties en dialyse



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

Door een sterk verminderde nierfunctie, wordt u hiervoor opgevolgd door één van de artsen van de dienst nierziekten. Ten gevolge van de verminderde nierwerking hebt u minder weerstand tegen infecties. Daarnaast is het mogelijk dat er in de nabije of verdere toekomst nood zal zijn aan een nierfunctievervangende therapie (dialyse en/of transplantatie). Om u zoveel mogelijk te beschermen worden een aantal vaccins dan ook ten zeerste aangeraden. U kunt met uw vragen altijd bij ons terecht. De contactgegevens staan op de achterkant van deze brochure.

De dienst nierziekten

Predialyse

Wanneer de nierwerking verder achteruitgaat, wordt u best voorbereid op dialyse of transplantatie en beschermd tegen hepatitis B. Hepatitis B is een virusaandoening die aanleiding geeft tot geelzucht, een ziekte waarvoor iemand met nierlijden zeer vatbaar is. Daarenboven verloopt een infectie met hepatitis B minder gunstig bij patiënten met nierlijden. Sinds het hepatitis B-vaccin beschikbaar is, wordt het altijd toegediend aan patiënten met een ernstige nierziekte. Het hepatitis B-vaccin is wettelijk verplicht voor hemodialysepatiënten.

De vaccinatie (Fendrix®) kost ongeveer 52 euro. Het schema bestaat uit 4 insputingen (dag 0, na 1 maand, na 2 maanden en na 6 maanden). Daarna zal via een bloedafname gecontroleerd worden of u over voldoende antistoffen beschikt. Als u niet beschikt over voldoende antistoffen is een bijkomende vaccinatie nodig.

Dialyse

Hepatitis B

In de meeste gevallen hebt u uw vaccinatieschema voor hepatitis B doorlopen bij de opstart van de dialyse. Als dit niet het geval is, gebeurt dat alsnog volgens onderstaand schema (besproken onder predialyse).

In de verdere opvolging, controleren we zesmaandelijks of u nog over voldoende antistoffen beschikt. Als dat niet het geval is, is een bijkomende vaccinatie met Fendrix® nodig.

Griepvaccin

Ook is het aangewezen jaarlijks in de herfst een griepvaccin te laten zetten omdat nierpatiënten meer vatbaar zijn voor de verwikkelingen van griep. Het vaccin kost ongeveer 7 euro. U kunt deze vaccinatie laten plaatsen tijdens een dialysesessie of door uw huisarts.

Pneumokokkeninfectie

Een pneumokokkeninfectie is de voornaamste oorzaak van longontsteking, wat een levensbedreigende aandoening is. De symptomen zijn: hoge koorts, pijn ter hoogte van de flank of rug, benauwdheid, neusvleugelademen, opgeven van etterige en mogelijk ook bloederige slijmen.

Een pneumokokkenvaccinatie vermindert de ernst van de aandoening. Er is keuze tussen twee vaccins: Prevenar® en Pneumo 23®. Prevenar® geeft een betere bescherming maar kost ongeveer 70 euro en de terugbetaling is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Pneumo 23® kost ongeveer 30 euro. Een combinatie van Prevenar® en pneumo 23® geeft de beste bescherming.

Het schema gevolgd door de dienst nierziekten van AZ Delta

Indien nooit gevaccineerd of vroegere vaccinatie onzeker:

Start Prevenar®

Na 8 weken rappel Pneumo 23®

Na 5 jaar rappel Pneumo 23®

Indien vroeger gevaccineerd met Pneumo 23®:

Na minimum 1 jaar, 1 Prevenar® geven

Na 5 jaar rappel Pneumo 23®

Indien u geen Prevenar® wenst:

Start met Pneumo 23®

Na 5 jaar rappel Pneumo 23®

Contact

Dispatch dialyse

t 051 23 38 98

e dialyse.administratie@azdelta.be

www.azdelta.be

Bron: dienst nierziekten