

Vocht longvliezen pleurapunctie



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

U hebt een afspraak voor een pleurapunctie. Dat is een onderzoek waarbij geprikt wordt tussen de ribben, naar de ruimte die zich bevindt tussen de ribben en de longen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts en wordt verricht:

- om na te gaan of er vocht tussen de longvliezen zit en van welke aard het is
- en/of om vocht tussen de longvliezen af te zuigen. Te veel vocht tussen de longvliezen kan de long in verdrrukking brengen waardoor kortademigheid, benauwdheid optreedt.

De punctie wordt meestal uitgevoerd op de kamer of in het echolokaal. We geven u graag wat meer informatie mee.

De artsen en medewerkers van de dienst oncologie en longziekten

1 Voorbereiding

Als u bloedverdünnende middelen of aspirines neemt, moet u dit vooraf melden aan de arts.

U mag bovenkledij uit te trekken of omhoog doen. Vervolgens mag u op de rand van het bed gaan zitten, de voeten ondersteund door een stoel of een kruk.

2 Het onderzoek

Eerst wordt de huid ontsmet. Dan krijgt u een prik waardoor de prikplaats verdoofd wordt. De verdoving kan een branderig gevoel geven.

Het onderzoek is door de verdoving in principe pijnloos. Zodra de verdoving goed zijn werk doet, brengt de arts de punctienaald tussen de ribben tot in de holte tussen de twee longvliezen.

- Als het pleuravocht uit de punctienaald stroomt, wordt het opgevangen in een laboratoriumbuisje. Bij voldoende vocht wordt de naald verwijderd. Vervolgens wordt het vocht voor

onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.

- Aan de punctienaald kan ook een afvoersysteem bevestigd worden. Hierdoor loopt het vocht af. Als er geen vocht meer komt, wordt de naald verwijderd. De insteekplaats wordt afgedekt met een pleister.

3 Na het onderzoek

Na het onderzoek doet u het best nog een half uur tot een uur rustig aan. Bedrust hoeft niet. De verpleegkundige gaat na of de prikplaats niet bloedt of lekt. De pleister kan thuis verwijderd worden.

Na het onderzoek kunt u weer normaal autorijden, douchen en werken.

4 Mogelijke complicaties

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Zo bestaat er een kleine kans op lekkage van de prikplaats, een bloeding of een klaplong wat leidt tot plotse kortademigheid. Als er een complicatie optreedt, neem contact op met uw arts.

5 Resultaat van de ingreep

Het resultaat van het onderzoek in het lab is meestal na een aantal dagen bekend.

6 Kostprijs

Met vragen omtrent de kostprijs kan u steeds terecht bij de dienst facturatie via factuur@azdelta.be of telefonisch op 051 23 39 89.

Contact

Secretariaat dienst longziekten

☎ 051 23 72 16

www.azdelta.be

Bron: dienst longziekten