

# Tafinlar 75 mg/Mekinist 2 mg

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

## Wat is Tafinlar/Mekinist?

- Dabrafenib in combinatie met trametinib is aangewezen voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker met een BRAF V600-mutatie.
- Bevat de stoffen Dabrafenib/Trametinib

## Hoe werkt Tafinlar/Mekinist?

- Voor patiënten waarbij ziekte gevolg is van een fout in gen BRAF V 600. Door deze fout wordt een abnormaal eiwit gevormd dat de groei van kankercellen bevordert.
- Tafinlar en Mekinist blokkeren de werking van het eiwit en vertragen zo de groei en verspreiding van kankercellen.

## Hoe wordt Tafinlar/Mekinist ingenomen ?

- Tafinlar 75 mg / Mekinist 2 mg
- Aanbevolen dosis Tafinlar is 150 mg (= 2 capsules van 75 mg)
- Aanbevolen dosis Mekinist is 2 mg (= 1 capsule van 2 mg)
- Tafinlar moet 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip ( 's ochtends en 's avonds met 12 uur ertussen ) ingenomen worden.
- Mekinist moet maar 1 maal per dag ingenomen worden met voorkeur in de ochtend maar kan ook in de avond.
- **Beide geneesmiddelen moeten nuchter ingenomen worden. Dit betekent 1 uur vóór het eten of 2 uur na het eten.**



- Capsules in zijn geheel innemen met water, **niet** op bijten, pletten of de capsules openen.
- Bij braken na doorslikken dosis, geen extra dosis innemen maar wachten tot volgend tijdstip van inname.
- **Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen!!**

## Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts hiervan op de hoogte te stellen, zo kan er nagegaan worden of er een wisselwerking zou kunnen optreden.
- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Tafinlar/Mekinist verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen.
- **Eet geen pompelmoes, drink géén pompelmoessap of gebruik geen preparaten op basis van sint-janskruid**

## Mogelijke bijwerkingen.

- Vermoeidheid/ duizeligheid/hoofdpijn
- Misselijkheid / Braken/verminderde eetlust
- Huiduitslag ( gevoeligheid aan zon en UV-licht ) en droge huid
- Verhoogd risico op verhoogde bloeddruk
- Diarree
- Invloed op bloedcellen + infectierisico
- Problemen met gezichtsvermogen( lichtflitsen zien, wazig of dubbel zien)
- Verdunning van het haar

## Nabehandeling thuis en praktische info

- Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten bereik van kinderen !!
- Tafinlar op kamertemperatuur en Mekinist **in de koelkast bewaren.**
- Na 2 weken is er een raadpleging, met een bloedafname vooraf, gepland om na te gaan of u niet te veel hinder heeft van de medicatie
- Na 6 weken is er een CT gepland en een bloedafname om na te gaan of de therapie aanslaat, nadien is er een CT en bloedafname om de 8 weken. Soms is er een langere tijd tussen afhankelijk van tolerantie en resultaten CT.
- U kunt enkel de medicatie verkrijgen in de ziekenhuisapotheek. Dus na

elke raadpleging krijgt u een voorschrift mee om de medicatie dan te kunnen afhalen in de ziekenhuisapotheek.

- Orale anticonceptie zal zijn werkzaamheid verliezen bij inname van Tafinlar/Mekinist, dus gebruik er een ander betrouwbaar voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Hoe lang u het geneesmiddel gebruikt is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is ook medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit in een potje en neem ze dan in.
- Bij misselijkheid mag u gerust medicatie nemen (Litican, Motilium of Primperan telkens 20 minuten voor elke maaltijd)
- Door problemen met gezichtsvermogen moet er opgelet worden met besturen van voertuigen of machines.
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.
- **Bij koorts van meer dan 38 graden moet u de huisarts, uw arts in het ziekenhuis of verpleegkundig consulent verwittigen.**
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje)