

# Medicatie Avastin® bevacizumab

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag wat meer uitleg.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

## Wat is Avastin®, bevacizumab?

Avastin is op zich geen chemotherapie in de strikte zin van het woord. Het product wordt een angiogenese remmer genoemd. Avastin® is een doelgerichte therapie (targeted therapy). De werkzame stof in Avastin®, bevacizumab.

Bevacizumab blokkeert de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan bevacizumab de groei van de tumor remmen.

Avastin kan gecombineerd worden met chemotherapie of kan als enige behandeling gegeven worden.

## Hoe wordt Avastin®, bevacizumab toegediend?

Het geneesmiddel bevacizumab wordt toegediend in de vorm van een infuus. U krijgt de behandeling in het dagziekenhuis oncologie en een behandeling duurt ongeveer een halve dag.

Afhankelijk van de chemotherapie die in combinatie gegeven wordt, krijgt u bevacizumab eenmaal om de 2 of 3 weken.

## Mogelijke nevenwerkingen

### Verhoogde bloeddruk

Door bevacizumab kunt u last hebben van een verhoogde bloeddruk. Daarom wordt uw bloeddruk gecontroleerd voor en na de toediening ervan. Een verhoogde bloeddruk moet



verder worden opgevolgd. Mogelijk krijgt u medicatie voorgeschreven tegen verhoogde bloeddruk.

### **Verhoogd eiwitgehalte in de urine**

Het eiwitgehalte in de urine kan verhoogd zijn. Daarom wordt uw urine gecontroleerd.

### **Verstoorde wondgenezing**

Omdat bevacizumab een normale wondgenezing kan verstoren, is het belangrijk dat u eventuele chirurgische ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met uw arts bespreekt. Uw arts zal sommige ingrepen tijdens uw behandeling met bevacizumab afraden. Om dezelfde reden is het belangrijk dat u eventuele wonden toont aan uw arts of verpleegkundige zodat zij voor een gepaste verzorging kunnen zorgen.

Door de toediening van bevacizumab kunt u last krijgen van **bloedingen** aan de slijmvliezen of van neusbloedingen.

### **Nabehandeling thuis en praktische info**

Als uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap