

## AFSPRAKEN TESTEN PATIËNTEN MET VERMOEDEN CORONAINFECTIE

### Wanneer een tweede test voorzien bij patiënten in de precohorte afdelingen?

Het is de bedoeling om patiënten zo snel als geïndiceerd/toegelaten door te verwijzen naar de gewone verpleegafdelingen en plaats vrij te houden voor nieuw opgenomen patiënten. Snelle doorlooptijden zijn essentieel! De risicoanalyse werd uitgevoerd door de pneumologen. We onderscheiden 3 risicogroepen onder de patiënten die in de precohorte opgenomen zijn:

1. Patiënten met een nog weinig suggestieve kliniek voor COVID. Deze info zal door de arts (een arts assistent wordt toegewezen aan de afdeling) overdag doorgegeven worden aan de hoofdverpleegkundige op de afdeling zodat patiënt, zodra een eerste negatief resultaat gekend is, naar een gewone afdeling kan overgebracht worden.
2. Patiënten met kliniek die suggestief blijft voor COVID: tweede staal na 48 is aangewezen – patiënt blijft in afwachting van het resultaat op de precohorte.
3. Patiënten met een zeer suggestieve kliniek ondanks eerste negatief staal: CT en tweede staalname (BAL) dmv bronchoscopie zal overwogen worden. Patiënt blijft op de precohorte.